
EPISODE 4-2

血清を探せ!

執刀医:月森孝介

患者名	ギルス感染者5名		
身長	―	体重	―
患部	肝臓、胃、膵臓	バイタル	90(99) 手術時間(分) 3:00:00
手術要項	①汎用血清を用い、活動停止状態にしたギルス体内から、体液を取得。		



The procedure of an operation

01 ギルス幼体に汎用血清を投与

02 エコー機能で影を表示する

03 臓器表面に切り出す

04 ギルス幼体に汎用血清を投与

05 切り傷を治療(出血線・小→P18)

06 02〜05を繰り返し、ギルス幼体の活動を停止させて捕獲

07 捕獲したギルス幼体にメスを入れ、体液を採取

08 マップを移動して次の患者の執刀を開始

09 V型、H型、P型の3種類の体液を入手するまで、上記手順を繰り返す

The patient is saved!



01
汎用血清を投与すると臓器内に潜り込む。キリアキの術式の要領でスキャナで影を表示させよう。



02
ギルスが臓器内で毒素を撒く回数は、ボーナス獲得に影響。回数を抑えるように手早く処置しよう。



07
制限時間の3分以内にひとりの患者を手術し、体内に潜んでいるギルスから体液採取すれば術式完了。



08
V、H、P型の3種類の抗原サンプル入手が、このエピソードのクリア条件。患者を探して移動しよう。



09
抗原サンプルの入手先はランダムなので、最少ならば3人、最多で5人の患者を執刀する必要がある。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	得点
MAX CHAIN○○以上	5	10	12	1000
毒素発生個数が○○個以下	10	5	3	500
○○○秒以上残して手術終了※	80	120	140	300
Miss判定なし	―	―	―	200

※分表示はそれぞれ、Easy 1:20 Normal 2:00 Hard 2:20


ランク	得点
C	0〜3599
B	3600〜3799
A	3800〜3999
S	4000〜
XS	4300〜

EPISODE 4-4

一人前

執刀医:月森孝介

患者名	沓掛真一(大人・男)		
身長	169.9cm	体重	65.9kg
患部	肝臓	バイタル	70(75) 手術時間(分) 5:00:00
手術要項	①対応血清の投与による、肝臓内の3対の「トリーティ」駆逐。		



The procedure of an operation

01 毒憩室に同色の血清を投与(毒憩室→P26)

02 非活性化した毒憩室を切り離す(毒憩室→P26)

03 01〜02を繰り返し、毒憩室×3を摘出(毒憩室→P26)

04 毒が噴出したら、バイタルを回復(バイタル回復→P18)

05 切除痕×3に人工膜を配置(毒憩室→P26)

06 配置した人工膜×3を定着させる(毒憩室→P26)

07 出現するトリーティ個体それぞれに同色の血清を投与(トリーティ→P28)

08 バイタルを回復(バイタル回復→P18)

09 07〜08を繰り返し、トリーティをすべて駆除(毒憩室→P26)

The patient is saved!



The patient
沓掛真一
SHINICHI KUTSUKAKE



01
毒憩室に同じ色の血清を投与し、憩室を収縮させる。一定量投与でガイドラインが表示される。



02
ガイドラインに沿ってすばやくメスを入れ、憩室を切り離す。切除に成功すると摘出可能となる。



03
毒憩室は最大サイズで破裂し、毒素をばらまく。毒憩室の処置は、それぞれを平行に進めよう。



07
毒憩室の処置のときと同じ要領で、同色の血清をそれぞれのトリーティに続けざまに投与する。



08
トリーティが術野に潜っているあいだは回復薬の投与のチャンス。バイタルの安定に努めたい。



09
トリーティが出現するまえにいずれかの血清を吸入して準備しておくと、すばやく投与が行なえる。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	得点
MAX CHAIN○○以上	10	15	18	500
毒憩室の発生個数が○個以下	9	6	3	500
○○○秒以上残して手術終了※	60	150	180	400
Miss判定なし	―	―	―	600

※分表示はそれぞれ、Easy 1:00 Normal 2:30 Hard 3:00

ランク	得点
C	0〜7299
B	7300〜7499
A	7500〜7999
S	8000〜
XS	8200〜